

Les journées raccourcissent, le froid commence à transformer les fraîches matinées en blanches gelées et vous vous dites qu'il est temps pour le jardinier d'hiberner... Erreur! Comme le dit le dicton, « à la sainte Catherine, tout bois prendre racine », le début de l'hiver est le meilleur moment pour s'activer à certaines de ses boutures!

Coupez, bouturez et partagez!

C'est le début de la saison de la taille et une majorité de plantes de climat tempéré peuvent être multipliées à cette période, en voilà une aubaine! Il ne se passe plus grand chose dessus certes, mais pleins de choses dessous! L'occasion parfaite pour vous de pouvoir au printemps prochain partager vos meilleures plantes.



3 types de boutures!

L'automne est principalement propice à trois types de bouturages :

- Les **boutures dites de bois sec**, correspondant aux arbustes et arbres caducs qui se bouturent à partir de rameaux d'environ 25 à 35 cm de long défeuillés.
- Les **boutures de bois vert**, à partir de sections identiques de végétaux semi-caduques ou de plantes méditerranéennes. Le bois est dit vert, car impérativement de l'année.
- •Les **boutures semi-aoûtées**, de végétaux persistants, qui se réalisent en fin été, début d'automne, lorsque les températures radoucissement et avant les froids.

La bouture d'automne...

Un jeu d'enfant : planter et attendre !

• L'automne représente une des meilleures périodes de bouture pour les végétaux tempérés car les températures baissent et l'humidité est forte, ce qui limite l'évaporation et donc le dessèchement des végétaux. Ceuxci pourront donc avoir le temps de cicatriser au niveau de la coupe et de créer des racines.

La bouture est une technique de multiplication végétative qui permet, avec un morceau d'une plante, de garder ses caractéristiques génétiques : on en produit alors un clone au contraire d'un semis. Cette technique à des intérêts par rapport à un semis : rapidité et reproduction a l'identique. Ce dernier point est aussi sa limite.

• On recense trois grands types de boutures d'automne : la bouture de bois sec (rameaux nus de végétaux caducs), la bouture en bois vert (ou bois tendre, exemple : les rosiers) ou encore la bouture semi-aoûtée pour les persistants. Enfin, pour les vivaces, la division de touffes ou la bouture de racines peut également s'effectuer préférentiellement en automne.

La bouture : méthodologie

Des étapes à respecter pour réussir!


Il faut prendre en compte le fait que ces plantes vont devoir affronter un hiver et **une longue période potentiellement sans racines**. Ainsi :

- Prendre des rameaux de l'année plutôt jeunes et pas trop longs : ces boutures auront moins tendance à se dessécher et l'émission racinaire en sera facilité garantissant une reprise plus vigoureuse.
- Mettre ces boutures à l'ombre et dans un endroit frais et plutôt humide : les période de gel ou de sec en hiver existent et peuvent malgré tout baisser largement le taux de réussite. Ainsi, l'abri du soleil direct est indispensable pour les boutures de bois sec. Le gel peut également être un facteur desséchant et l'abri du gel est conseillé. Les boutures doivent rester dehors idéalement à des températures comprises entre 2° et 8°.
- Couper une moitié des feuilles des boutures semi-aoûtées ou de bois vert : les végétaux persistants vont avoir des rameaux feuillus dont il convient de réduire l'évapotranspiration pour faciliter la reprise. Ainsi, il est conseillé de couper les feuilles du bas et de moitié les feuilles du rameau qui seront laissées (il est indispensable de laisser minimum 5 ou 6 feuilles pour que la plante continue sa photosynthèse).
- Si ce sont des plantes méditerranéennes : ne pas mettre les boutures trop à l'ombre, ce qui nuirait à leur reprise par manque de lumière. Ces plantes, part leur feuillage, résistent bien mieux a l'évapotranspiration même au stade non raciné.



Comment préparer ces boutures ?

La préparation des boutures est une étape indispensable pour qu'elle puisse survivre durant le temps d'émission des racines.



Une question de période!

Les périodes de bouturage s'étalent tout au long de l'année, contrairement aux idées reçues. Cependant, elles diffèrent selon les végétaux.

- Les plantes méditerranéennes : elles se bouturent du mois de septembre au mois de mai. L'idéal étant en début d'automne pour avoir de belles plantes dès la saison suivante. Ainsi, vous pouvez bouturer les lavandes, les sauges officinales, les phlomis, les cistes, le romarin, la sarriette, les hélicrysums, la santoline, les myrthes ou encore les armoises arborescentes. Attention, certaines plantes considérées comme méditerranéennes viennent en réalité de climat un peu plus chaud et réclament un bouturage en été comme les plantes subtropicales : les lauriers roses, les hibiscus, les lantanas ou encore les bougainvillées.
- Les arbustes persistants de climat tempérés : ils se bouturent facilement à partir de mi-septembre à début novembre (selon la douceur des journées). Vous pouvez ainsi bouturer les photinias, le houx, les osmanthes, les choisya, les escallonias, les pittosporums, les abelias... Attention, certains arbustes persistants peuvent être difficiles à bouturer ou leur origine demande un bouturage d'été à l'étouffée.
- Les arbustes caducs : ils se bouturent bien à partir de la fin d'automne, sur une période allant jusqu'à maximum mi-janvier. Gardez à l'esprit que le plus tôt, en fin d'automne, est le mieux et la période idéale est entre mi-novembre et mi-décembre. Ainsi les lilas, forsythia, viornes caduques, les seringats, les hortensias les weigelia, les saules... Cela est valable pour tout végétal caduque de climat tempéré océanique ou continental. Cela vaut également pour les grimpantes caduques et les rosiers.
- Les vivaces : la mi-fin d'automne est une excellente période pour la division des touffes des plantes vivaces ou le bouturage de racines pour certaines. Multipliez ainsi vos aster, acanthes, iris, marguerites, chrysanthèmes, hosta, rudbeckias, anémone du japon...



Petite astuce

N'hésitez pas à mettre plusieurs bouture dans le même contenant pour multiplier vos chances de réussite, notamment pour les boutures réputées difficiles. Vous pourrez toujours les rempoter le printemps venu pour les diviser. Certaines plantes gagnent également a être bouturées par 6 ou 7 dans le même pot comme les lavandes, sauges officinales, sarriettes, hébés ou encore romarin et autres cistes, afin d'obtenir des touffes denses prête à planter au printemps, vous permettant de gagner un temps précieux!

CRÉDITS: sauf mention contraire, toutes les photos et illustrations du présent document © CAUE 37 (publication novembre 2025)

ADRESSES UTILES

Information complémentaires

Informations sur les techniques sur les boutures : www.cnpmai.net/fr/2020/09/12/le-bouturage-comment-ca-marche/ www.jardinsdefrance.org/le-bouturage-ou-comment-naissent-les-racines-adventives/

CAUE 37

Le CAUE 37 vous conseille pour votre projet. Prenez rendez-vous ! 34 place de la Préfecture _ 37000 TOURS 02 47 31 13 40 _ caue37@caue37.fr _ www.caue37.fr

Indre-et-Loire
Ca.u.e
Conseil d'architecture, d'urbanisme